

ایجاد اختلال اسکیزوفرنی موثر می دانند که شامل موارد زیر می باشد

۱- آسیب پذیری : بدین معنی که برخی از افراد به طور ارثی و ژنتیکی بیش از سایر افراد آمادگی ابتلا به اختلال اسکیزوفرنی را دارند بنابر این تنظیم برخی از مواد شیمیایی در مغز به هم می خورد و اشکال در عملکرد بعضی از ساختارهای مغز باعث بروز علائم می شود

۲- تنش و فشارهای روانی : عبارت است از شرایط جدیدی که در زندگی ما رخ می دهد و ما باید خود را با آن سازگار کنیم عوامل آسیب پذیر فرد را مستعد بیماری می کند و فشارهای روانی نیز شروع بیماری را تسهیل می نماید. به عنوان مثال فرد مستعد کم خونی قلبی ممکن است در اثر فشار روانی دچار سکته قلبی شود.

درمان اسکیزوفرنی

رفتارهای آشفته : رفتارهای فرد نسبت به رفتار معمولش تغییر می کند و رفتارهای عجیب و غریب انجام می دهد .

عدم تناسب عواطف و احساسات : عدم تناسب احساسات با شرایط زمانی و مکانی حاکم بر موقعیتی که فرد در آن به سر می برد مثلا هنگامی که از مرگ نزدیکانش صحبت می کند می خنده یا سرد و بی تفاوت است .

علت اسکیزوفرنی :

هر نوع بیماری در اثر اختلال عملکرد طبیعی یک یا چند سیستم بدن بروز می کند به عنوان مثال بیماری دیابت (بالا بودن قند خون) به دنبال اختلال در ترشح انسولین و به علت عملکرد بد سیستم هورمونی و غددی بدن بروز می کند . بر مبنای همین اصل ، بیماری اسکیزوفرنی بدن بال اختلال در عملکرد دستگاه عصبی به ویژه مغز به وجود می آید .

تا کنون علت دقیق و چگونگی این تغییرات به دقت روشن نشده است اما دو عامل مهم را در

اسکیزوفرنی از بیماریهای مزمن روانپردازی می باشد که با آشفتگی نسبتا طولانی مدت در گفتار ، ادراک ، تفکر ، عاطفه ، اراده ، قضاآت و فعالیت اجتماعی مشخص می گردد .

نسبت ابتلا در زن و مرد مساوی است .

علائم اسکیزوفرنی :

عقاید نادرست (هذیان) : اعتقاد محکم نسبت به موضوعی که واقعیت ندارد و با ارائه هیچ دلیل یا توضیحی از بین نمی رود .

توهم : دیدن ، شنیدن یا حس کردن چیزهایی که وجود خارجی ندارد .

اختلال گفتار: به کار بردن کلمات بدون رعایت دستور زبان که در شکل شدید آن کلام بیمار قابل فهم نیست فرد مبتلا ممکن است احساس عجیبی پیدا کرده و کاملا ارتباطش را با جهان قطع کند .

تغییر رفتار : رفتار فرد نسبت به رفتار معمولش تغییر می کند

شماره سند: ۹۵/eq/102/246	عنوان سند: پمفت آموزشی پژوهیه بیماران	
شماره بازنگری: ۴	دفتر بهبود کیفیت و آموزش	بیمارستان ۲۲ بهمن

درمان های غیر دارویی : این نوع درمان ها به تنها ی و بدون دارو درمانی اثر بخش نیست بلکه باید هم زمان با مصرف داروها برای سازگاری بیشتر و بهبود عملکرد به کار رود . از جمله این درمان ها می توان به مشاوره ، روان درمانی فردی ، آموزش خانواده ، آموزش مهارت های اجتماعی به بیمار اشاره کرد .

درمان دارویی : اسکیزوفرنی اختلالی است که با دارو قابل کنترل می باشد . بدليل اینکه امكان عود این اختلال وجود دارد درمان دارویی باید بلند مدت صورت گیرد . تنظیم داروها فقط با نظر پزشک معالج تغییر می کند و شما اجازه تغییر نحوه یا میزان مصرف داروها یا توقف مصرف آنها را ندارید .

در مواردی که بیمار افکار خودکشی و دیگر کشی دارد یا رفتار بسیار نامناسب و آشفته (از جمله ناتوانی برای بر آورده ساختن نیازهای اولیه مثل غذا ، لباس و مکان زندگی در کار باشد باید در بخش بستری و مراقبت گردد . بستری شدن موجب کاهش استرس بیمار می گردد و به او در سازماندهی فعالیت های روزانه اش کمک می کند عوارض ناخواسته داروها (گرفتگی عضلات ، بی قراری ، خشکی دهان ، احتباس ادرار و خواب آlodگی) می تواند باعث عدم رغبت بیمار به مصرف دارو و عدم بهبودی او گردد که درمان به موقع عوارض دارویی با مراجعه به پزشک می تواند به پذیرش درمان توسط بیمار کمک کند .

منبع: www.medlinplus.gov

کلینیک آموزش سلامت
بیمارستان ۲۲ بهمن
۳۰۹ - داخلی ۱۶

