

تب کریمه کنگو:

باعث پدیدار شدن تب و خونریزی شدید در بیماران می شود.

ویروس تب کریمه در درجه اول از نوعی کنه و احشام به انسان ها منتقل می شوده همچنین انتقال از انسان به انسان نیز می تواند به دلیل ارتباط نزدیک خونی ارتباط با ترشحات بدن و مایعات بدن فرد بیمار میسر شود.

هنوز واکسن تب کریمه کنگو برای مقابله با انتقال این بیماری یافت نشده است.

تب کریمه کنگو بیماری است که توسط یک ویروس منتقل شوند از نوعی کنه ایجاد میشوند .

این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه (جزیره ای در اوکراین) مشاهده شدوبه همین علت این بیماری کریمه نام گرفت، سپس در سال ۱۹۶۹ بود که این

بیماری جان چندین انسان را گرفت و از آنجا بود که اسم فعلی این بیماری شکل گرفت.

تب هموراژیک(خونریزی دهنده)کریمه کنگو هم اکنون در بخش های شرقی اروپا، کشورهای حوزه مدیترانه، شمال غربی چین، اسیای میانه و شبه قاره هند یافت میشود.

تب کریمه کنگو چگونه منتقل می شود:

کنه ها به خصوص انها ی که از گونه ی هیالومما هستند عامل به وجود امدن و همچنین انتقال ویروس CCHF هستند. انواع زیادی از حیوانات و حشری و اهلی نظیر گاوهای بزها، گوسفندان و خرگوش ها میزبان های تقویت کننده ی ویروس تب کریمه هستند.

انتقال این ویروس به انسان ها از طریق نیش مستقیم کنه های بیمار و یا خون حیوانات امکان پذیر است، انتقال از انسان به


به سایر انسان ها نیز می تواند از طریق ارتباط خونی و سایر مایعات بدن به وقوع بپیوندد. همچنین گاهی اوقات خود بیمارستان ها نیز از عوامل گسترش این بیماری بوده اند. گند زدایی نادرست و غیر اصولی تجهیزات پزشکی بیمارستان و همچنین استفاده ای دوباره از سوزن های تزریقات می توانند از عامل پخش بیماری باشند.

تب کریمه کنگو چگونه تشخیص داده میشود :

از مایش هایی که برای تشخیص قطعی ویروس تب کریمه استفاده می شود شامل:

از مایش الیزا: این روش عمومی در رشته های بیوشیمی غربالگری است الیزا از مایشی استاندارد برای کشف انواع ویروس در خون است.

شماره سند:	عنوان سند:	دفتر بهبود کیفیت و آموزش
QI/EQ/125	پمفت آموزشی	بیمارستان ۲۲ بهمن
تاریخ تدوین:	ویژه پرسنل	
تاریخ بازنگری:		
۹۷/۳/۹		
۱۴۰۳/۱۱/۰۶		



ویژه بیماران

تب کریمه کنگو

کلینیک آموزش سلامت
بیمارستان ۲۲ بهمن
۳۰۹ - داخلي ۳۲۵۹۵۵۱۶



منبع: www.medlineplus.com

علائم تب کنگو نشانه های آن:

شیوع بیماری بسیار سریع و باشانه های اولیه ای همچون سرد درد، تب بالا، درد کمر درد مفاصل، درد شکم و استفراغ همراه است. علت تب مشخص نیست. همچنین چشمان قرمز، سرخ شدن صورت یا پیشرفت بیماری، کبود شدن منطقه ای بدن و خونریزی شدید بینی نیز اغاز میشوند. این اتفاق حدودا در روز چهارم ابتلا به بیماری شروع شده و تا دو هفته ادامه می یابد.

درمان تب کریمه کنگو:

درمان بیماری در درجه اول حمایتی است و بیمار نیاز به مراقبت دارد، مراقبت و یا حمایت از بیمار باید شامل توجه به مایعات بدن او، رفع اختلالات الکترو لیتی وی، مراقبت برای اکسیژن درمانی و محافظت از وی در برابر سایر بیماری ها و ویروس ها باشد. ویروس CCHF به داروهای ضد ویروسی ریبا ویرین حساس است در بسیاری از مناطق استفاده از این دارو و مشاهده نتایج مثبت گزارش شده است.