

((به نام خدا))

عفونت خون یا سپسیس، وضعیتی است که در آن بدن با یک عفونت جدی می‌جنگد. این حالت می‌تواند به دلیل حمله به سیستم‌های دفاعی بدن شما و یا به دلیل مواد سمی که توسط عوامل عفونی مثل باکتری، ویروس و یا قارچ‌ها ایجاد می‌شود، حاصل گردد.

افرادی که در ریسک این مشکل هستند؟

۱- افرادی که سیستم ایمنی بدنشان به دلیل بیماری‌های مختلف مثل سرطان یا ایدز از کار افتاده است.

۲- افرادی که سیستم ایمنی آن‌ها هنوز کامل نشده. مثل بچه‌های خردسال که دچار عفونتی می‌شوند ولی به طور کامل و درست درمان نمی‌شوند.

۳- افراد بسیار پیر که یک بیماری طولانی و زمینه‌ای مثل دیابت دارند، یکی از دلایل افزایش مرگ و میر ناشی از عفونت خون این است که پزشکان شروع به درمان سرطان ها و پیوند اعضا کرده‌اند و در این درمان‌ها از داروهایی استفاده می‌شود که سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند.

دلیل سپسیس چیست؟

میکروب‌های زیادی می‌توانند باعث عفونت خون شوند که از بین آن‌ها باکتری‌ها مهمترین عامل هستند.

۵- مشاهده خونریزی کوچک پوستی

۶- درد در مفاصلی مثل ستون مهره‌ها، مج دست، ران، آرنج و زانو

چه وقت به بیمارستان مراجعه کنید؟

۱- در کودک زیر ۰ عروز بیحالی، کاهش اشتها، تغییر رفتار طبیعی و دانه‌های غیر معمول پوستی

۲- اگر یکی از اعضای خانواده دچار اختلال سطح هوشیاری، افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس، تب و لرزش با پزشک خود تماس یگیرید و یا به اوژانس بیمارستان مراجعه کنید

معاینات و آزمایشات

در بیمارستان پزشک ممکن است انواع آزمایشات و معاینات را انجام دهد

۱- آزمایش خون به وسیله یک سوزن که در ساعد یا بازو وارد شده و مقداری خون در چند لوله آزمایش می‌گیرد و آزمایش انجام شده که آیا تعداد گلوبولهای سفید بالا رفته یا نه؟

۲- کشت خون

۳- نمونه مخاط - اندازه و مایع نخاع و مایع درون آبسته نمونه گیری شود

۴- عکس رادیولوژی سینه برای عفونت ریه و یک سی تی اسکن شکم برای عفونت شکم

عفونت ریه، عفونت مثانه، عفونت پوست، عفونت‌های شکمی مثل آپاندیسیت یا عفونت‌های مناطق دیگر مثل منژیت می‌توانند منتشر شده و به سپسیس تبدیل شوند. عفونت‌های بعد از جراحی‌ها هم می‌تواند باعث سپسیس شوند.

چه کسانی در معرض خطر هستند؟

۱- افراد بسیار جوان و بسیار پیر

۲- هر کس که پسوند اعضا انجام داده باشد

۳- کسانی که شیمی درمانی می‌شوند و اشعه می‌گیرند.

۴- افرادی که بیماری طولانی مدت دارند مثل ایدز یا دیابت

۵- افرادی که آسیب‌ها و سوختگی‌های شدید دارند

۶- افرادی که دارای عفونت هستند منژیت، سلولیت، عفونت دستگاه ادراری، آپاندیس پاره شده

سپسیس چه علائمی دارد؟

۱- در بیمار دچار سپسیس حرارت بدن طبیعی، بالا و یا گاهی پایین می‌باشد. ۲- می‌تواند لرز داشته باشد

۳- افزایش ضربان قلب و تنفس

۴- کاهش سطح هوشیاری، هزیان و گیجی ممکن است مشاهده شود.

درمان عفونت خون

درمان در خانه:

درمان در خانه ندارد و یک اورژانس پزشکی است که درمان آن باید در بیمارستان و یا حتی در بخش مراقبت های ویژه انجام شود.

درمان دارویی:

۱-شاید لازم باشد برای شما اکسیژن گذاشته شود بدین صورت که ماسکی روی دهان شما گذاشته شده و از طریق لوله ای از کنار بینی تان به شما اکسیژن داده می شود.

۲-طبق نتایج تست های پزشک دارو تجویز می کند که می تواند شامل آنتی بیوتیک هایی که از طریق وریدی داده می شوند باشد. عموماً از آنتی بیوتیک هایی استفاده می شود که طیف وسیعی از باکتری ها را از بین می برنند چون عموماً معلوم نیست که کدام باکتری باعث بیماری شده است. به محض اینکه جواب کشت خون ، نوع باکتری را معلوم کرد ، پزشک آنتی بیوتیک مخصوص آن باکتری را تجویز می کند ممکن است دستور تزریق محلول نمکی وریدی را بدهد تا حجم خون را افزایش بدهد.

پیش آگاهی یا (شانس زندگی)


پیش آگاهی بستگی به سن و وضع سلامتی گذشته فرد دارد.

اگر فرد شخص پیری با بیماری های زیادی باشد و سیستم ایمنی او خوب کار نکند و عفونت خون پیشرفته ای داشته باشد احتمال مرگش حدود ۸۰ درصد است .

بر عکس اگر فرد سالم ، بدون بیماری زمینه ای باشد احتمال مرگ کمتر از ۵ درصد است.

روی هم رفته احتمال مرگ در سپسیس ۴۰ درصد است البته باید خاطر نشان کرد پیش آگاهی به زمانی که تشخیص و درمان انجام می شود بستگی دارد

هر چه سریعتر درمان را شروع شود، نتیجه بهتری خواهیم داشت.



منبع: www.medline.com



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹-۳۲۵۹۵۵۱۶

شماره سند Q1/EQ/2013	عنوان سند: پمفت آموزشی ویژه بیماران	IAUM
تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۱	دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن	
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱		

عفونت خون یا سپسیس