

شماره سند: ۹۸/EQ/۱۵۷

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۱۸

عنوان سند:
پمفت آموزشی
ویژه پرسنل



دفتر بهبود کیفیت و آموزش
بیمارستان ۲۲ بهمن

مراقبت های پس از ترخیص با سوند ادراری



ویژه بیماران

کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹ - ۳۲۵۹۵۵۱۶

کیسه ادراری را به صورت ذیل اماده و تمیز کنید

کیسه ادراری را تخلیه کنید . برای تمیز کردن ، انتهای مسیر خروجی را باز بگذارید .

مواد تمیز کننده اماده و تهیه کنید (مخلوط یک فنجان سرکه و یک فنجان آب خنک ، سرنگ CC50 ، فاصله یا پوشش برای اتصال به لوله)

آب را به وسیله سرنگ در کیسه ادراری وارد کرده و از مسیر خروجی ان تخلیه و ببندید

یا استفاده از یک سرنگ ، نصف کیسه ادراری را با نصف محلوا سرکه پر کنید و کیسه ادراری را ببندید و اجازه بدھید که این مایعات در کیسه ادراری برای مدت ۳۰ دقیقه بماند .

محلول تمیز کننده را تخلیه کنید ، کیسه ادراری را آب خوب بشوئید و دوباره ان را تخلیه کید .

یا استفاده از سرنگ هوا را وارد کیسه ادراری کنید . مسیر خروجی را باز گذاشته و کیسه ادراری را با خشک شدن اویزان کنید .

زمانیکه کیسه ادراری خشک شد ان را در داخل ظرف نگه دارید .

با دعای سلامتی برای شما عزیزان

www.medlinplus

تعویض کیسه ادرار :

دست هایتان را با آب و صابون بشوئید

قبل از اینکه شما شروع به تعویض کیسه ادراری بکنید ، کیسه ادراریتان را خالی کنید . (برای اجتناب از ریختن ادرار زیاد)

کیسه ادراری تمیز را کنترل کنید و مطمئن باشید کلامپ ان بسته است

قبل زا تعویض ، هردو انتهای کیسه ادراری را با الکل تمیز کنید .

برای اجتناب از ریختن ادرار حین جداشدن ، سوند ادراری را ببندید .

کیسه ادراری الوده را جدا کرده و کیسه ادراری تمیز را وصل نمایید .

کیسه ادراری جدید را به پا با چسب یا تسممه پایی وصل کنید .

دستتان را با آب و صابون یا ماده ضد عفونی کننده بشوئید .

تمیز کردن کیسه ادراری :

می بایستی بلا فاصله بعد از جدا کردن کیسه ادراری الوده ، ان را تمیز و برای استفاده مجدد اماده کنید .

در مردان : از محل ورود سوند به صورت دایره وار از ورودی الٰت تا تمام لگن تمیز کنید .

در زنان : اطراف پرینه تان را از جلو به عقب تمیز کنید

در صورت مواجه با هریک از علائم ذیل با پزشکتان تماس بگیرید

_ علائم عفونت مجرای ادراری : تب بالای ۳۷,۷ ، لرز ، درد در ناحیه تحتانی پشت ، ادرار کدر ، بوی شدید ادرار

_ ادرار خونی

_ عدم تخلیه ادرار

_ نشست ادرار از اطراف سوند



شما می بایستی زماینکه کیسه ادراری $\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ از ادرار پر است ، ان را تخلیه کنید . به خاطر داشته باشید دستتان را قبل از تماس با کیسه ادراری بشویید .

_ مایعات فراوان ۴-۳ لیتر در روز بنوشید مگر اینکه مایعات طبق تجویز پزشک محدود شده باشد (با رقیق شدن ادرار از تجمع رسوبات و باکتری در ادرار جلوگیری می شود)

_ از الکل و نوشیدنی های کافئین دار اجتناب کنید .

_ در مورد دوش گرفتن از پزشکان سوال فرمایید ، توصیه می شود داخل وان نشوید

_ محل ورودی سوند را روزی دوبار تمیز کنید تا از ورود باکتری و ایجاد بو و التهابات پوستی جلوگیری شود . در صورت وجود ترشحات اطراف محل ، تعداد دفعات تمیز کردن را بیشتر کنید .

جهت تمیز کردن محل ورودی سوند بدین صورت عمل کنید:

_ دستتان را قبل از تماس با سوند یا کیسه ادراری بشوئید

_ اطراف سوند را با حرکت دورانی از نزدیک ترین ناحیه به محل ورود سوند با اب گرم و صابون ملایم بشویید و با دستمال خشک و تمیز کنید .

_ خود سوند را تمیز کنید (از محل ورود سوند به سمت خارج تا چندین سانتی متر پایین لوله ان را تمیز کنید در صورتیکه در جهت عکس این عمل را انجام دهید باعث انتقال باکتری به داخل مجرای می شود)

سوند ادراری چیست ؟ سوند نوعی لوله باریک است که جهت تخلیه ادرار داخل مجرای ادرار داده می شود به طوریکه انتهای ان در مثانه است که دو نوع موقع و دائم دارد . در برخی از شرایط با نظر پزشک معtag ممکن است برای حفظ جریان دائم ادرار این سوند قرار داده شده و لازم باشد برای مدتی بستگی به نظر پزشک دارد در عمل باقی بماند .

لذا در صورتی که شما با سوند ادراری تথیص میشوید لازم است نکات زیر را رعایت کنید:

- برای جلوگیری از کشیدگی و جا به جا شدن سوند با چسب یا تسمه قابل ارجاع به پایتان ثابت کنید . برای مردان به بالای ران و پایین شکم و در زنان به ران ثابت گردد

- همیشه کیسه ادراری را زیر سطح مثانه نگه دارید تا از برگشت جریان ادرار به داخل مثانه جلوگیری کند و اجازه دهد که ادرار به راحتی تخلیه شود

- پیشنهاد می گردد که کیسه ادراری جدا از زمین و در یک سطل پلاستیکی یا کیسه ضد اب باشد .

- مسیر سوند را به طور مرتب از لحاظ پیچ خوردن یا خم شدگی کنترل کنید تا مطمئن شوید که مسیر سوند جهت نخلیه ادرار ازاد می باشد .