

سمومیت صنعتی:

اقدامات پیشگیرانه:

- باید مکان کاردارای تهیه مناسب باشد.
- در صورت نیاز، دستکش عینک ایمنی پیش بندولباس محافظ پوشند.
- پرهیز از کشیدن سیگاردر همه جا و هر زمان لازم است

درمان:

- ابتداباید یکی از حاضرین کوشش نماید تابع سم صنعتی رامشخص نماید وظرفی که فردبان مسموم شده است را به مرکز درمانی ببرد.
- مصدوم را باید چه بیهوش چه هوشیار دروضعیت ریکاوری (سربه پهلو، شکم به طرف زمین) قرار بدهد.
- هیچگاه تلاش نکنید فرد مسموم را وادار به استفراغ کنید.

سمومیت دارویی:

اقدامات پیشگیرانه:

- به تاریخ انقضای دارو توجه کنید و از مصرف داروهای تاریخ گذشته بپرهیزید.
- در ترکیبات بسیاری از داروهای سرماخوردگی استامینوفن وجود دارد در نتیجه مصرف همزمان داروی استامینوفن با داروهای سرماخوردگی میتواند احتمال سمیت کبدی را افزایش دهد از افزایش خودسرانه دوز دارو اجتناب کنید.
- مصرف داروهای کم خطر نیز میتواند در مقادیر بالاخترناک باشد بخصوص اگر مصرف کننده کودک یا مسن باشد.
- اگر به کودک خود دارو میدهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل اینبات، شکلات و یا خوارکی استفاده نکنید.
- داروها به ویژه داروهای خوش طعم را از دسترس کودکان دور نگه دارید ممکن است در غفلت شما کودک اقدام به خوردن دارو کند.

کشنده ترین داروهای دارو هایی هستند که به صورت داخل و ریدی تجویز میشود

درمان:

- سوالات دارویی و موارد مسمومیت را پیش از رسیدن به مراکز درمانی باشماره تلفن ۱۴۹۰ ویاوارژانس ۱۵ ادرمیان بگذارید.
- برای کمک به مصدوم باید نام ماده مصرف شده میزان مصرف و زمان مصرف را به گروه درمانی توضیح دهید.
- برای کمک به فرد مسموم باید اورا در اسرع وقت به مرکز درمانی رساند چون لحظات اولیه بسیار حیاتی است.

www.nursingconsult



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹ - ۳۲۵۹۵۵۱۶

عنوان سند: پمفت آموزشی ویژه بیماران	دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
---	---

مسومیت:

همیشه در همه جا و برای همه کس پیشگیری بهتر از درمان است به ویژه در مسمومیت اقدامات پیشگیری ساده و بی هزینه هستند آنها را جدی بگیریم عمل کنیم و به دیگران توصیه کنیم

اگرچه در کشور مالار دقيقی از موارد مسمومیت و اثار عوارض و تلفات ناشی از آن در دسترس نیست ولی در ایالات متحده امریکا هر سال بیش از ۱۲۰۰ مورد مرگ و میر را بدون در نظر گرفتن علت آن میتوان جلوگیری کرد. اینک ا نوع مسمومیت هارا مورد بررسی قرار میدهیم:

- ۱- مسمومیت سموم خانگی
- ۲- سموم کشاورزی
- ۳- سموم صنعتی
- ۴- واکنش های دارویی

۱- مسمومیت خانگی:

اقدامات پیشگیرانه:

- تمام ظروف محتوی سموم خانگی باید محکم و کاملا درسته باشد. داروها و حشره کش ها باید در کابینت های قفل دار نگه داری شود
- وسایل گرم زمانند بخاری ها و گاز آشپزخانه باید به اندازه کافی تهویه شوند.

- مواد غذایی باید کاملا سرد یعنی در درمای ۵- یا کاملا گرم در درمای بالای ۶۵ درجه مصرف شوند.

درمان:

- درمان خانگی مسمومیت تازمانی مجاز است که بیمار احساس سردرد و سرگیجه نکند چرا که پس از ازان بیمار خطرناک میشود.
- در مسمومیت های غذایی خوردن چند حبه سیر میتواند حالتان را بهتر کند (سولفور موجود در سیر باعث تقویت معده میشود).



- توصیه میشود افرادی که دچار مسمومیت های خفیف شده اند در هر وعده غذایی خود مرزه مصرف کنند (کیاه مرزه دارای خاصیت گرمابخشی و خاصیت ضد نفخ و ضد عفونی کننده است).

۲- مسمومیت کشاورزی:

اقدامات پیشگیرانه:

- این سموم باید در ظروف کاملا مشخص باشد
- اگر با سموم کشاورزی سرو کار داریم باید با پیدا کردن لوازم و لباس محافظت کننده استفاده کنیم.
-

درمان:

- تمام بیمارانی که از طریق تنفسی (مسمومیت با سموم علف کش ها) مسموم شده اند در ابتدا دارای علیم الرژیک (سرمه، ابریزش بینی) هستند
- این افراد باید بلا فاصله به پایگاه های درمانی بردند
- شوند
- افراد همراه بیمار باید بلا فاصله فردراز منبع سم دور کرده و لباس های اورا شل کنند.

