

شماره سند: EQ/123

تاریخ تدوین: ۷/۳/۹۷

تاریخ بازنگری: ۷/۱۱/۱۴۰۳

عنوان سند:

پمفت آموزش
ویژه پرسنل



دفتر بهبود کیفیت و آموزش
بیمارستان ۲۲ بهمن

نحوه استفاده از قلم انسولین



ویژه بیماران

کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۰۹۱۵۵۹۰۰۱۶ - داخلی

- ❖ قلم را نیم تا یک ساعت قبل از مصرف از یخچال بیرون بیاورید.
- ❖ تزریق باید با دستان پاکیزه و در محل مناسب و تمیز صورت گیرد.
- ❖ استفاده از الکل در موضع تزریق توصیه نمی شود چون ممکن است الکل توسط سرسوزن به داخل باقف ها حمل شود و موجب واکنش موضعی شود. درصورت مصرف الکل حتماً اجازه دهد که محل کاملاً خشک شود.
- ❖ ماساژ محل تزریق انسولین توصیه نمی شود زیرا سبب افزایش جذب انسولین می شود و زمان اثر انسولین غیرقابل پیش بینی می شود.
- ❖ بعد یا قبل از دوش آبگرم یا سونا تزریق را انجام ندهید چون افزایش درجه حرارت پوست سبب افزایش سرعت جذب انسولین می شود.
- ❖ سعی کنید که از روی لباس تزریق نکنید. چرا که طول سوزن کوتاه می شود و احتمال تزریق نامناسب بیشتر می شود و از طرف دیگر منطقه تزریق هم مورد بررسی قرار نمی گیرد.
- ❖ از تزریق در ریشه مو، زخم ها، خال یا سایر ضایعات پوستی جدا خودداری کنید.




با دعای سلامتی برای شما عزیزان

www.medlinplus

برای شروع تزریق انسولین باید:


- ✓ انگشتان را دور قلم مج کنید تا محکم نگه داشته شود، شست را روی دکمه بالای تزریق بگیرید.
- ✓ با دست دیگر محل تزریق را کمی چین بدھید.
- ✓ سوزن را به سرعت و عمود (زاویه ۹۰ درجه) وارد کنید و سپس چین را رها کنید.
- ✓ دکمه تخلیه را فشار دهید تا متوقف شود. (پنجره مقدار دارو به صفر برخواهد گشت)
- ✓ پنج تا ده ثانیه سوزن را داخل بدن نگه دارید تا انسولین پس از تزریق به بیرون نشست نکند.



قدم هفتم برداشتن سوزن است. برای این کار سوزن را به طور مستقیم از پوست خارج کنید. می توانید به آرامی پنبه یا دستمال نخی را در محل تزریق بگذارید اما محل را ماساژ نندهید. درپوش خارجی سوزن را مجدداً بر روی آن قرار داده و پیچ آن را سفت کنید. سوزن مصرف شده را از روی قلم باز کنید و داخل سطل زباله با بدن سخت بیندازید و سپس درپوش قلم را مجدداً بگذارید.




چهارمین قدم انتخاب دوز مناسب برابر با تجویز پژوهش است. شما باید دکمه مقدار انسولین را تا مقدار مورد نظر بچرخانید تا دوز مطلوب را تنظیم کنید. عقریه تنظیم دوز را دو بار کنترل کنید تا از مقدار دوز مورد نظر اطمینان حاصل کنید. چنانچه تنظیم دوز مورد نیاز مقدور نمی باشد باید از وجود مقدار کافی انسولین در مخزن اطمینان حاصل کنید.




قدم پنجم انتخاب محل تزریق است. شکم بهترین محل برای تزریق بیشتر انواع انسولین می باشد. چهار موضع اصلی تزریق انسولین به ترتیب سرعت جذب شامل:

شکم (طرفین ناف)،
بازو ها (سطح پشتی بازو ها)،
ران ها (سطح قدامی ران ها)
و باسن می باشد




قدم سوم تست اینمی قلم انسولین است، این عمل حباب های هوا را خارج کرده و شمارا مطمئن می سازد که سوزن و قلم به درستی کار می کنند، بنابراین:

- پیچ تنظیم کننده مقدار انسولین را که در انتهای قلم قرار دارد تا یک یا ۲ واحد بچرخانید.
- قلم را بالا نگهدارید و دکمه تخلیه را کاملاً فشار دهید تا خروج قطره انسولین را مشاهده کنید.
- اگر لازم بود این عمل را تکرار کنید تا قطره انسولین را در نوک سوزن ببینید.
- چنانچه پس از ۳ بار تکرار انسولین خارج نشد، سوزن را با یک سوزن جدید تعویض و دوباره امتحان کنید.



استفاده از انسولین و تزریق روزانه آن همواره نگرانی برای بیماران دیابتی محسوب می شود، اما زمانی که آنان با فواید انسولین درمانی و نحوه استفاده درست از قلم انسولین آشنا شوند، با آرامش خیال بهتری برای درمان خود گام بر می دارند.

قدم اول آماده کردن قلم انسولین است. ضروری است قبل از شروع مطمئن شوید که نوع انسولین را درست انتخاب کرده اید.



دومین قدم آماده کردن سوزن است. برای این کار ابتدا درپوش کاغذی سوزن را جدا کنید. سوزن را به طور مستقیم و محکم به سر قلم بپیچانید سپس درپوش بیرونی سوزن را بردارید و درپوش داخلی سوزن را جدا کنید.

