

علائم:

فتق معمولاً بدون علامت است. با این حال برخی افراد ممکن است دچار ناراحتی یا درد در هنگام ایستادن، تکان دادن یا بلند کردن اجسام سنگین شوند. شایع ترین شکایت افراد معمولاً ضربه ای است که دردناک و به مرور زمان در حال رشد است.

هنگامی که فتق بزرگتر می شود ممکن است در درون سوراخ گیر کند و باعث قطع جریان خون بافتی گردد. این مورد اورژانس است و باعث درد و تورم در محل تنگی می شود. برخی از علائم این افراد شامل موارد زیر است:

- تهوع و استفراغ
- عدم توانایی انتقال گاز و یا حرکت روده

هنگامی که علائم بالا بروز می کند فرد باید بلاfacسله تحت عمل جراحی قرار گیرد.

عوامل خطر:

- افزایش ناگهانی وزن و چاقی
- بلند کردن اجسام سنگین
- اسهال یا بیوست
- سرفه مداوم یا عطسه
- بارداری
- هر فعالیتی که فشار داخل شکم را افزایش دهد.

معمولًا دیواره شکم قوی است. عضلات و صفاق از روده ها محافظت می کنند و آن ها در سرجای خود نگه می دارند اما اگر در یک نقطه از دیواره ضعف وجود داشته باشد فتق می تواند اتفاق بیفتد. این ضعف ممکن است از زمان تولد فرد وجود داشته باشد و یا در طول زندگی به وجود بیاید. فتق در حال رشد در شکم بسیار شایع است. فتق اغلب اوقات در مردان بالای ۴۰ سال دیده می شود.

هرنی یا فتق زمانی اتفاق می افتد که بخشی از یک ارگان داخلی یا بافت از خلال یک دیواره ضعیف عضلانی بیرون زدگی پیدا کند. فتق ها معمولاً رایج هستند. آنها می توانند مردان، زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار دهند. فتق در واقع به دلیل ترکیبی از ضعف عضله و افزایش فشار _مانند بلند کردن اجسام سنگین_ اتفاق می افتد. بعضی از افراد با ضعف مادرزادی عضلات دیواره شکم متولد می شوند.

انواع:

- فمورال، در زیر کشاله ران اتفاق می افتد و بروز آن در زنان بیشتر از مردان می باشد.
- مقعد، این شایع ترین نوع فتق است.
- در اطراف ناحیه شکم
- از طریق یک اسکار
- هیاتال، یک نقص کوچک در دیافراگم که باعث حرکت احشا قسمت فوقانی شکم به سمت بالا و درون قفسه سینه می شود.
- مادرزادی

تشخیص:

اگر فکر می کنید ممکن است فتق داشته باشید با پزشک خود مشورت کنید. یک پزشک معمولاً می تواند فقط را در یک معاینه فیزیکی تشخیص دهد. یک فقط کوچک و نرم که باعث درد نمی شود ممکن است به زودی به درمان نیاز نداشته باشد.

اگر یک فقط دردناک و بزرگ شد پزشک معالج ممکن است مشاوره جراحی را درخواست کند.

اگر پزشک نمی تواند با ماساژ، روده را به داخل شکم برگرداند به این معناست که روده در جدار شکم گیر افتاده است. این وضعیت بسیار خطرناک است زیرا ممکن است باعث قطع جریان خون بافت مورد نظر گردد.

درمان:

جراحی تنها درمان قطعی فقط است. در جراحی فقط، بافت ضخیم دیواره شکم (فالسیا) تعمیر می شود و هرگونه اخلال و سوراخ در دیواره آن بسته می گردد. اکثر فقط ها با بخیه بسته می شوند و گاهی اوقات برای بستن آن از تکه های میش استفاده میکنند.


نتیجه اکثر عمل های جراحی موفقیت آمیز است و احتمال برگشت مجدد فقط بسیار نادر است.

جلوگیری:

برای جلوگیری از فقط:

- استفاده از تکنیک های مناسب بلندکردن اجسام
- کاهش وزن
- جلوگیری از بیوست با مصرف فیبر زیاد، نوشیدن مایعات فراوان

منبع: medlineplus



کلینیک آموزش سلامت
بیمارستان ۲۲ بهمن
۳۰۹ - داخلی ۳۲۵۹۵۵۱۶

عنوان سند:	پمفت آموزشی هویژه بیماران	دانشگاه علوم پزشکی اسلامی دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
شماره سند:	۹۶/EQ/110	شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۴۰۳/۱۱/۲۰

