

درمان :

الف) راههای درمان طبی (داروئی) هموروئید

۱- نشستن در لگن آب ولرم و بتادین.

۲- استفاده از داروهایی که از یبوست پیش گیری می کنند.

ب) درمان جراحی: در عمل جراحی هموروئیدهایی که گشاد و متسع شده باشند بوسیله عمل جراحی برداشته می شوند.

عوارض جراحی هموروئید

الف- بی اختیاری مدفوع

ب- افزایش سوزش و خارش بدلیل ترشحات نامیه

ج- عود هموروئید (دوباره ایجاد شدن هموروئید)

نکات قابل توجه برای بیمار

الف- در صورت هر نوع فونریزی بعد از عمل یا درد شدید به پزشک خود مراجعه کنید.

ب- در صورت بی اختیاری مدفوع به پزشک مراجعه کنید.

ج- به نکاتی که پزشکان و پرستاران بیمارستان

می گویند کاملا گوش کرده و آنها را یک به یک اجرا کنید.

منبع: سایت معاونت درمان

هموروئید

ویژه بیماران

بفش داخلی جراحی مردان



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۲۵۹۵۵۱۶ - داخلی ۳۰۹

شماره سند:

92/Q/102/114

شماره بازنگری: ۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

عنوان سند:

پمفلت آموزشی



دفتر بهبود کیفیت
بیمارستان ۲۲ بهمن

هموروئید:

عبارتست از گشادشدن سیاهرگهای نامیه مقعد که یکی از شایعترین بیماری های جراحی می باشد که متأسفانه بدلیل نداشتن آگاهی افراد و همپنین بدلیل موقعیت آناتومیک آن(که در نامیه مقعد) می باشد کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اکثر مردم هنگامی مراجعه می کنند که نیاز به درمان جراحی دارند. در مالیکه با مراجعه زودرس و مشورت با پزشک میتوان با درمان طبی(داروئی) آنرا علاج کرد.

در نامیه مقعد(شرمگاه)بعد از پوست به نامیه مخاط(لایه نازک پوست) می رسیم در این نامیه (گهایی وجود دارد که در صورت فشار زیاد و ضربه مانند رگهای پاکشاد می شوند و دیواره این رگها نازک میشود و باعبور مدفوع سفت دچار فونریزی می شوند .

یکی از شایعترین علائم هموروئید فونریزی بعد از دفع و اجابت مزاج است

سوزش و خارش در نامیه مقعد از دیگر علائم این بیماری است.

انواع هموروئید :

الف) هموروئید داخلی: هموروئیدهای داخلی که توسط لایه نازک پوست(مخاط) پوشیده شده اند معمولاً فونریزی کرده و یا دچار بیرون زدگی(پرولاپس) می شوند ولی درد ندارند. شکایت بیماران بصورت احساس پرتشدگی رکتوم(راست روده) می باشد. که همراه با ترشح موکوس چکیدن قطرات خون روشن در هنگام اجابت مزاج می باشد.

بطور کلی علائم هموروئید داخلی عبارتست از:

۱- فونریزی بدون درد.

۲- احساس پرتشدگی رکتوم(راست روده)

۳- ترشح موکوسی و چکیدن قطرات خون روشن در هنگام اجابت مزاج.

ب) هموروئید خارجی: در این هموروئید که در زیر پوست مقعد وجود دارند در طول زمان می تواند بعلت اتساع مکرر بزرگ شود گاهی اوقات وجود یک لفته در درون یک هموروئید خارجی باعث درد شدید و در صورت عبور لفته موجب فونریزی خواهد شد.

بنابراین مهمترین علامت هموروئید خارجی درد شدید می باشد.

افرادی که بمدت طولانی دچار یبوست(مدفوع سفت) هستند و مدفوع سفت بطور مداوم با این رگها در تماس است بیشتر دچار این حالت می شوند.

بطور کلی عوامل زیر احتمال ایجاد هموروئید را در فرد افزایش می دهند:

۱- مدفوع سفت

۲- زور زدن طولانی مدت

۳- افزایش فشار داخل شکم(مانند دوران حاملگی).