

در جراحی واریکوسل یا به اصطلاح پزشکی واریکوسلکتومی اقدام به بستن وریدهای بیضه‌ی مبتلا می‌کنند که پس از بستن رگها برگشت خون از مسیر دیگری انجام می‌شود.

### آموزش‌های قبل از عمل؟

❖ جراحی واریکوسل ععمولاً با بی‌هوشی کامل یانیمه بیهوشی و یا از طریق بیحسی کمری انجام می‌شود. شما می‌توانید پس از مدت کوتاهی به‌فعاليت روزمره‌ی غیرستگین خود(مانند کار) با نظرپردازی برگردید.

❖ قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال عفونت، لازم است استحمام کنید.



❖ موهای ناحیه عمل(کشالهی ران)، لازم است قبل از جراحی کاملاً کوتاه شود.

❖ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، لنز، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.  
❖ کلیه‌ی لباسها، لباس زیر و جورابهای خود را درآورید و لباس مخصوص اتاق عمل پوشید.

### واریکوسل چگونه تشخیص داده می‌شود؟

\*ممکن است پزشک در معاینه، توده‌ی کلاف ماندبدون دردی در طناب بیضه لمس کند. اگر توده به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد هنگام ایستادن پزشک توده را لمس می‌کند ولی اگر توده کوچک باشد ممکن است از شما بخواهد که نفس عمیقی بکشید و چند ثانیه نفس خود را نگهدارید و به پایین زور بزنیدو در این حالت در معاینه، واریکوسل لمس می‌شود.

ممکن است از روشهای تصویربرداری جهت تایید تشخیص کمک گرفته شود ، اما مهمترین روش تشخیص واریکوسل معاینه است.

### در چه مواردی جراحی انجام می‌شود؟

در بیشتر موارد واریکوسل منجر به مشکلات پزشکی‌شده و نیاز به درمان نیز پیدا نمی‌کند ولی در صورتیکه موارد زیر مشاهده شود جراحی برای شما پیشنهاد می‌گردد:

✓ آترووفی(کوچک شدن بیضه).  
✓ ناباروری(که با آزمایش شمارش اسپرم مشخص می‌شود).

✓ درد شدید بیضه

به اتساع(گشاد شدن) عروق خونی(سیاهه‌گهای) که ممکن است در اطراف یک یا هر دو بیضه‌ی مردان اتفاق بیفتد واریکوسل گویند.

سیاهه‌گهای در واریکوسل گشادر از حد معمول می‌شوند. واریکوسل را از روی پوست اسکروتوم(کیسه‌های که بیضه را نگه میدارد) می‌توان لمس یا مشاهده کرد.

### علت واریکوسل چیست؟


واریکوسل در اثر گشاد شدن رگهای خونی به علت رکود خون در سیاهه‌گهای بیضه بوجود می‌آید و در بیضه‌ی چپ شایع‌تر است.

### علایم واریکوسل چیست؟

▪ اغلب افراد هیچگونه علایمی ندارد، گاهی اوقات ممکن است موجب دردهای مبهم در بیضه شود. در طول روز به دلیل فعالیت بدنی و ایس تادن ب دتر می‌شود. این دردها با خوابیدن به پشت کاهش می‌یابد.

▪ واریکوسل بر تولید اسپرم در بیضه‌ها اثر می‌گذارد و تعداد زیادی از مردانی که دچار ناباروری هستند واریکوسل دارند. این شایع‌ترین علت ناباروری قابل‌صلاح با عمل جراحی است.

شماره سند:	عنوان سند:	
95/eq/102/321		
تاریخ تدوین:		
۱۰/۶/۳۰		
تاریخ بازنگری:		
۰۳/۱۱/۳۰		
شماره بازنگری:		
۱	پمفت آموزشی ویژه بیماران بهمن	دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲



# واریکوسل

## چه میدانید؟

کلینیک آموزش سلامت  
بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹ ۳۲۵۹۵۵۱۶



قرمزی خفیف و یا تغییر رنگ جزئی در اطراف برش  
کشاله‌ی ران ممکن است بوجود بیاید که خود به  
خود بهبود می‌یابد.

★ احساس سفتی اطراف و زیر محل عمل تا ۳ هفته  
بعد از بین خواهد رفت.

★ تا چند روز پس از عمل ترشح مقدار کمی از مایع  
کمرنگ از محل برش جراحی طبیعی است، محل  
راتمیز و خشک نگهداری.

★ اگر محل جراحی گرم، متورم، قرمز و دردناک شد  
و مقدار قابل توجهی مایع از محل برش خارج گردید  
و یا تب داشتید به پزشک خود مراجعه کنید.

★ جهت کشیدن بخیه ۷-۱۰ روز پس از عمل به مرکز  
بهداشتی - درمانی مراجعه نمایید.

**حال‌زی اسلامی برای شما مددجوی گردید**

[www.nursingconsult.com](http://www.nursingconsult.com)

\* قبل از خروج از بخش جراحی، ادار خود را  
تخلیه کنید.

آموزش‌های بعد از عمل چیست؟

\* در صورت هوشیاری کامل و عدم وجود مشکلات  
گوارشی مانند تهوع و استفراغ با اجازه پرستار نوشیدن  
مایعات (آب کمپوت، چای کمرنگ و آبمیوه)  
برای شما شروع خواهد شد در صورت تحمل مایعات  
کم کم سایر موادغذایی برای شما آغاز می‌شود.

\* زمانی که به شما اجازه داده شد تخت خود را  
ترک کنید، ابتدا مدتی بر لبی تخت نشسته و پاهای  
خود را آویزان کنید، در صورتی که سرگیجه  
نداشتید میتوانید با کمک پرستار راه بروید.

\* عموماً پانسمان ناحیه‌ی عمل در بیمارستان برداشته  
می‌شود و ۴۸ الی ۲۲ ساعت پس از جراحی  
میتوانید حمام کنید.

\* در صورت داشتن درد میتوانید از استامینوفن  
یا آیوبیوفن استفاده نمایید.