

دو نوع لخته شدن خون می تواند باعث سکته مغزی ترومبوتیک شود:

#### • ترومبوز عروق بزرگ:

شایع ترین نوع سکته مغزی ترومبوتیک (ترومبوز عروق بزرگ) در شریان های بزرگتر مغز رخ می دهد. در بیشتر موارد به علت آترواسکلروز طولانی مدت همراه با تشکیل سریع لخته خون است. کلسترول بالا فاکتور خطر مشترک برای این نوع سکته مغزی است.

#### • ترومبوز عروق کوچک:

شکل دیگری از سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون یکی از عروق خونی کوچک مسدود شود. در مورد علل این نوع سکته مغزی اطلاعات کمی وجود دارد اما با فشارخون بالا ارتباط دارد.

سکته ایسکمیک به دو صورت می تواند رخ دهد:


۱. در این نوع لخته خون یا قطعه پلاک از جایی از بدن (معمولا قلب) منشأ می گیرد و به مغز منتقل می شود. هنگامی که لخته در مغز قرار می گیرد، رگ های خونی کوچک مغز را مسدود می کند و مانع از خون رسانی به قسمتی از مغز می شود. این فرآیند در اصطلاح پزشکی آمبولی نامیده می شود.

۲. در نوع ترومبوتیک در درون یکی از شریان هایی که خون را به مغز می رسانند یک لخته تشکیل می شود. این نوع سکته مغزی معمولا در افراد دارای سطح کلسترول بالا و آترواسکلروز دیده می شود.

سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که جریان خون به مغز متوقف می شود. بدون دسترسی به خون و مواد مغذی غنی از اکسیژن، سلول های مغزی شروع به سو عملکرد و مرگ می کنند.

در سکته مغزی ایسکمیک یک رگ خونی که خون را به مغز وارد می کند به وسیله یک لخته خونی مسدود شود و خون رسانی به بخشی از مغز با اشکال مواجه شود. فشارخون بالا مهمترین عامل خطر برای این نوع سکته مغزی است. سکته های مغزی ایسکمیک حدود ۸۷ درصد از سکته های مغزی را تشکیل می دهند.



شماره سند: 96/EQ/101 شماره بازنگری: ۵ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	<b>عنوان سند:</b> <b>پمفلت آموزشی</b> <b>ویژه بیماران</b>	 دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
---	---	--

## سکته مغزي



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۲۵۹۵۵۱۶ - داخلی ۳۰۹

درمان: درمان سکته مغزي شامل موارد زیر است:

۱. درمان اضطراري: هنگامی که يك فرد مي تواند در عرض چندساعت پس از سکته مغزي به بیمارستان برسد، ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی با توجه به نوع سکته مغزي، آن را با داروها، جراحی و یا هردو کنترل مي کنند.
۲. جلوگیری از سکته مغزي دیگر: يك بیمار مبتلا به سکته مغزي ممکن است براي جلوگیری از سکته از داروهای رقیق کننده خون استفاده کند. هم چنین ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی براي جلوگیری از سکته مغزي مجدد تغییرات شیوه زندگی مانند رژیم غذایی سالم و ورزش را توصیه مي کنند.
۳. توانبخشی: چندین نوع از درمانها مي تواند به بازمانده سکته مغزي کمک که بعضی یا تمام عملکردهای آسیب دیده سکته مغزي را بازیابی کند. این درمان ها شامل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و درمان روان شناختی مي باشد.

منبع: medlineplus

علائم:

علائم سکته مغزي شامل موارد زیر است:

- اختلال ناگهانی در دید در يك یا هردو چشم
  - بی حسی یا ضعف ناگهانی صورت، بازو یا پا به خصوص در يك طرف بدن
  - سردرگمی ناگهانی، اختلال در تکلم یا درک گفتار
  - درد ناگهانی در هنگام راه رفتن، سرگیجه، از دست دادن تعادل یا هماهنگی
  - سردرد ناگهانی شدید بدون علت شناخته شده
- چنانچه هر يك از علائم را دارید باید به سرعت به بیمارستان براي شروع درمان مراجعه نمایید.

