


ممکن است دچار آزردهی گلو شوید که برای چند روز قابل انتظار است. در صورتی که قادر به دفع ادرار خود نبودید و یا دچار لرز درد شکم - تهوع - استفراغ - مدفوع قیری یا استفراغ خونی حتماً به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید




بعد از انجام ERCP چه اقداماتی صورت میگیرد؟

پس از آزمون فشارخون و نبض شما به طور مرتب و برای چند ساعت کنترل خواهد شد . تا زمانی که پزشک و پرستار اجازه به شما نداده اند از خوردن و آشامیدن خودداری کنید . ۶ ساعت پس از آن می توانید از مایعات یا غذای سبک استفاده کنید معمولاً در روزهای بعد می توانید از رژیم غذایی قبل از آزمون برخوردار باشید.



www.nursingconsult.com

شماره سند: 95/eq/102/313	عنوان سند: پمفلت آموزشی ویژه بیماران	 دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
تاریخ تدوین: ۹۵/۴/۱۳		
تاریخ بازنگری: ۰۳/۱۱/۳۰		
شماره بازنگری: ۷		

ای آر سی پی (ERCP) چیست؟



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۲۵۹۵۵۱۶ - داخلی ۳۰۹

مددجوی گرامی

با آرزوی سلامتی برای شما

مطالب زیر به منظور آشنایی با اقدام (آی آر سی پی) تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

ای آر سی پی (ERCP) چیست ؟

بررسی مجاری صفراوی با آندوسکوپ می تواند وضعیت مجاری صفراوی و مجاری پانکراس را برای ما مشخص کند. یا به عبارت دیگر تصویر برداری از مجاری صفراوی و پانکراس از طریق آندوسکوپ را کلانژیوگرافی رتروگراید یا به طور اختصار ERCO می نامند.

در این عمل ، ماده حاجب از طریق آندوسکوپ به داخل مجرای صفراوی تزریق و سپس تصویربرداری انجام می گیرد

ERCP در چه مواردی انجام می شود

سنگ های صفراوی که در مجاری صفراوی اصلی به دام افتاده باشند .

در تومور مجرای صفراوی برای گذاشتن استنت انجام می شود

در موارد پانکراتیت و کلانژییت صورت می پذیرد .

علامت بالینی انسداد مجرای صفراوی چیست ؟

درد بالای شکم با علت نامشخص به خصوص اگر با زردی پوست و تیره شدن رنگ ادرار همراه باشد .

چه مواردی قبل از ERCP باید رعایت شود ؟

از ۸ ساعت قبل از انجام ERCP ناشتا باشید .

پزشک در جریان داروهایی که مصرف می کنید قرار دهید (به خصوص داروهای ضد انعقادی مانند آسپرین -پلاویکس- وارفارین و ریوارکسابان)

حساسیت های دارویی خود را به پزشک در میان بگذارید .

دستوراتی که پزشک به شما می دهد را با دقت اجرا کنید .

در صورتی که باردار هستید حتما پزشکتان را مطلع سازید .

در روز انجام ERCP یک نفر همراه داشته باشید .


شب قبل از ERCP حدود ۶ ساعت بعد از ظهر شام سبک بخورید .

جواب آزمایش خون PTT,PT) و سایر مدارک موجود را حتما با خود همراه داشته باشید .

در صورتی که مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی هستید و موافقت کتبی متخصص قلب یا ریه را همراه خود بیاورند .

لباس سبک و بدون دکمه فلزی به تن نمایید.

قبل از ERCP فراموش نکنید که مثانه خود را تخلیه کنید .



حین انجام ERCP چه اقداماتی انجام می شود ؟

شما بر روی تخت رادیوگرافی قرار خواهید گرفت .

در حین انجام آزمون نبض و فشارخون شما کنترل خواهد شد برای اینکه در طی عمل عمل کمتر احساس ناراحتی کنید برای شما یک آرامبخش تجویز خواهد شد .

جهت باز نگه داشتن دهان و حفاظت دندان های شما یک محافظ دهانی استفاده می شود .

در طی انجام عمل شما قار به صحبت کردن نخواهید بود اما مشکلی در نفس کشیدن نخواهید داشت .

یک آنژیوکت که بر روی دست چپ شما تعبیه می شود و داروهایی به منظور آرامش و شل شدن عضلات دستگاه گوارش دریافت خواهید کرد .

پزشک لوله باریکی از طریق آندوسکوپ به سمت مجاری صفراوی هدایت خواهد کرد و از طریق آن ماده حاجب را به داخل مجرای صفراوی تزریق کرده و عکس از زوایای مختلف تهیه خواهد کرد .

بعد از عکس برداری برش کوچکی در حد چند میلی متر در

ابتدای مجرای صفراوی که پاپی نام دارد داده می شود که

بتوانند سنگ گیر افتاده را خارج کنند

که می تواند عوارضی شامل خونریزی سوراخ شدگی روده و

التهاب پانکراس (پانکراتیک) ایجاد نماید که احتمال وجود

این عوارض بسیار کم است

این عوارض بین ۲ تا ۲۰ درصد احتمال اتفاق افتادن دارد که

می تواند خفیف یا شدید باشد .