

ترولاک:

همان طوری که می دانید در درمان بسیاری از بیماران ، نیاز به استفاده از کاتتر های عروقی مانند شالدون ، پری ماکت ، پورت و کاتتر ورید مرکزی بوده و از مراحل اولیه شروع درمان در این بیماران می باشد. یکی از بزرگترین مشکلات در بیمارانی که از کاتترهای عروقی در درمان آن ها استفاده می شود عفونت های ناشی از این کاتتر ها می باشد. این عفونت ها به علت وجود باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها از طریق انتهای کاتتر که بیرون از بدن قرار دارد به داخل کاتتر نفوذ کرده و سبب علائمی مثل تب و لرز می شود در نتیجه کاتتر بیمار عفونی شده و درمان آن شامل بستری شدن در بیمارستان آنتی بیوتیک تراپی و گاهی تعویض کاتتر به وسیله جراحی می باشد . این روند باعث ایجاد عوارض گوناگون افزایش هزینه های بستری بیمار در بیمارستان ، انجام جراحی های متعدد و کار گذاشتن کاتتر جدید و... است.




با توجه به پیشرفت تکنولوژی در خصوص کمپانی تجهیزات پزشکی و دارو **Tauropharm** آلمان ، ماده ای آنتی سپتیک به نام ترولاک تولید کرده است که نقشی بسیار مهم و موثر در کنترل عفونت ناشی از کاتتر ها دارد . محلول ترولاک شامل یک ماده آنتی سپتیک وسیع الطیف است که روی کلیه باکتری ها و قارچ ها حتی در نوع مقاوم به درمان اثر کرده و مانع از بوجود آمدن عفونت های ناشی از کاتتر خواهد شد.

در نتیجه کاتتر کارایی خود را حفظ کرده و عفونت پیش نمی آید و از لخته شدن و بسته شدن کاتتر جلوگیری می کند و طول عمر کاتتر بیمار را افزایش خواهد داد .



لازم به ذکر است محلول های فوق هیچگونه عوارض دارویی نداشته و تازمانی که بیمار تحت درمان است توسط ترولاک از عفونت محافظت خواهد شد و بلافاصله بعد از استفاده از ترولاک اگر در داخل کاتتر گونه ای از باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها وجود داشته باشد در عرض ۲ تا ۲۴ ساعت از بین رفته و بیمار با همان کاتتر اولیه به دیالیز ادامه خواهد داد.



شماره سند Q1/EQ/139	عنوان سند:	
تاریخ تدوین ۹۸/۱۰/۲	پمفلت آموزشی	دفتر بهبود کیفیت و آموزش
تاریخ بازنگری ۱۴۰۲/۱۱/۲	ویژه بیماران	بیمارستان ۲۲ بهمن

ترولاک



کلینیک آموزش سلامت
 بیمارستان ۲۲ بهمن
 ۳۰۹- داخلی ۳۲۵۹۵۵۱۶



در ضمن ترولاک دارای خاصیت ضد انعقادی

(هیپارین + سیترات ۴٪) بوده و مانع از ایجاد لخته در انتهای کاتتر خواهد شد در نتیجه تا زمانی که در درمان بیمار از محلول ترولاک برای جلوگیری از بسته شدن کاتتر استفاده شود ، درمان تا مدت طولانی ادامه خواهد یافت . استفاده از ترولاک علاوه بر اینکه آثار درمانی بسیار موثری خواهد داشت موجب می شود بیمار وضعیت بسیار مطلوبی را در طول درمان از نظر روحی و روانی داشته باشد و دوران دیالیز خود ا به بهترین شکل سپری نماید

