

((به نام خدا))

## سرکلاژ چیست؟

سرکلاژ یک نوع جراحی است که در موارد نارسایی دهانه رحم و خروج محصولات حاملگی (جفت و جنین) و سقط انجام می‌گیرد.

نارسایی دهانه رحم به حالتی گفته می‌شود که بافت دهانه رحم تحمل توانایی وزن محصولات حاملگی را نداشته و در طول حاملگی بدون هیچ گونه علامتی (درد، انقباضات رحمی و ...) باز شده و باعث خروج محصولات حاملگی و سقط می‌شود.

معمولًا سقط ناشی از نارسایی دهانه رحم در اولین بارداری در سه ماهه دوم بارداری رخ می‌دهد ولی ممکن است در بارداری های بعدی زودتر هم اتفاق بیفتد.


در اثر باز شدن دهانه رحم کیسه آب به سمت خارج از دهانه رحم برجسته شده و معمولًا وقتی دهانه رحم تا حدود ۴ سانتی متر باز شود کیسه آب پاره شده و با انقباضات رحمی شروع می‌شود و در نهایت به خروج محصولات حاملگی و سقط منتهی می‌شود.

## علل نارسایی دهانه رحم

علل نارسایی دهانه رحم متفاوت است. نارسایی دهانه رحم می‌تواند مادرزادی باشد و در اثر ناهنجاری های ساختمانی دهانه رحم ایجاد شود. در بعضی مواقع به دنبال آسیب های واردہ به دهانه رحم در اثر دستکاری های جراحی و درمانی، عفونت، پارگی در اثر زایمان سخت یا سقط عمدی و ... نارسایی ایجاد می‌شود.

نارسایی دهانه رحم معمولًا زمانی تشخیص داده می‌شود که بیمار سابقه سقط های مکرر بدون درد در سه ماهه دوم حاملگی داشته باشد.

البته معاینه فیزیکی و سونوگرافی نیز در تشخیص نارسایی کمک کننده می‌باشد. درمان نارسایی دهانه رحم جراحی است. در نارسایی دهانه رحم برای حفظ و تداوم حاملگی عمل سرکلاژ (دوخت حلقه‌ای دهانه رحم) انجام می‌شود.



## نحوه عمل سرکلاژ

عمل سرکلاژ به روش های مختلفی صورت می‌گیرد.

روش های مختلف سرکلاژ اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته و عموماً انتخاب آن ها برای بیمار، به شرائط بیمار و نظر پزشک معالج ارتباط دارد. به طور کلی در عمل سرکلاژ با استفاده از نخ بخیه مخصوص، دهانه رحم به روش خاصی بسته می‌شود.


عمل سرکلاژ دهانه رحم تحت بی‌حسی نخاعی یا بیبهوشی عمومی انجام می‌گیرد و چند ساعت پس از انجام عمل در صورت تثبیت وضعیت عمومی، بیمار مرخص می‌شود.

سرکلاژ از سقط و زایمان زود رس جلوگیری نموده و در ۸۵ تا ۹۰ درصد موارد درمان نارسایی دهانه رحم موفقیت آمیز بوده است.



شماره سند: Q1/EQ/203	عنوان سند: پمفت آموزشی ویژه بیماران	دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
تاریخ تدوین: ۹۷/۷/۴ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		

## سرکلاز



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹ - ۳۲۵۹۵۵۱۶

## مراقبت های مجدد به پزشک

در صورت بروز هر یک از علائم زیر باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

بروز انقباض رحمی و درد زیر شکم و کمر مثل دردهای زایمان

خونریزی واژینال

تب بالای ۳۸ درجه با لرز

تهوع و استفراغ

ترشح زیاد واژینال

پارگی کیسه آب

## زایمان پس از عمل سرکلاز

قبل از شروع دردهای زایمان باید بخیه دهانه های رحم برداشته شود تا زایمان امکان پذیر باشد. بنا بر این باید در این موقع فرد در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته تا به موقع در خصوص باز کردن بخیه سرکلاز اقدام شود

عمل سرکلاز دلیلی برای انجام سزارین نمی باشد

Med line plus: منبع

## مراقبت های قبل و بعد از عمل سرکلاز

- شب قبل از عمل بیمار باید یک شام سبک مثل سوب مصرف نماید و پس از آن دیگر هیچ نوع مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف نکند.
- بعد از انجام عمل سرکلاز معمولاً چند ساعت در بخش تحت مراقبت قرار می گیرد و سپس مرخص می شود.
- بیمار باید چند روز در منزل استراحت کرده و از انجام کارهای سنگین و گاهها روابط زناشویی تا پایان دوران بارداری خودداری کند.
- انجام کارهای روزمره بعد از پایان دوران استراحت بلامانع است.
- بعد از سرکلاز در بعضی مواقع کمی خونریزی و لکه بینی ایجاد می شود که ممکن است طی مدت یک الی دو روز ادامه داشته باشد و سپس قطع می گردد.

- فرد باید یک هفته قبل و یک الی دو هفته بعد از عمل سرکلاز از نزدیکی پرهیز نماید.

