

تنگی نفس ، خون دماغ ، سردرد ، سرگیجه

### علل افزایش فشار خون

الف: عوامل خطرزایی که می توانید کنترل کنید عبارتند از :

#### وزن :

به طور کلی افرادی که اضافه وزن دارند در خطرند و در بیماران دیالیزی افزایش بیشتر از ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم وزن بین دو جلسه دیالیز با افزایش قابل توجه فشار خون همراه است و ارتباط مهمی بین این دو وجود دارد.

#### رژیم غذایی

رژیم پرسدیم (نمک) ممکن است خطر را زیاد کند. غذاهای پرچربی نیز می توانند باعث افزایش وزن شوند. کم تحرکی ، استرس (فشار روانی) جلسات کوتاه دیالیز (کمتر از ۴ ساعت)

#### محروم الکل و سیگار

ب) عوامل خطرزایی که نمی توانید کنترل کنید:

فشار خون مینیمم به مراتب خطرناک تر از افزایش فشار خون ماکزیمم است.



#### افزایش فشار خون در بیماران دیالیزی

فشار خون بالا نه تنها یکی از مهمترین علت های نارسایی مزمن کلیه ها می باشد بلکه در صد قابل توجهی از بیماران دیالیزی در صورت عدم درمان مناسب به بیماری های قلبی - عروقی (عمده ترین علت مرگ و میر در این بیماران) مبتلا می شوند.

به فشار خون بالا قاتل بی صدا می گویند. زیرا اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا ظاهرها هیچ علامتی ندارند.

#### علائم احتمالی عبارتند از :

### فشار خون چیست؟

فشار خون یا هایپرتانسیون فشاری است که خون موقع عبور از رگهای خونی به دیواره آنها وارد می کند. نوسانات فشار خون طبیعی اند. مثلا فشار خون وقتی استراحت می کنید یا خوابیده اید افت می کند. وقتی فعالیت یا ورزش می کنید بالا می رود اما اگر فشار خون بالا باقی بماند طبیعی نیست.

#### فشار خون ماکزیمم و مینیمم یعنی :

هر فردی دارای دو فشار خون می باشد که یک فشار خون حد اکثر یا ماکزیمم می باشد و آن زمانی است که قلب در حال فعالیت است این فشار در افراد مختلف متفاوت بوده و در فرد بالغ حدود ۱۲۰ میلی متر جیوه است. فشار خون ماکزیمم بیش از ۱۶۰ خطرناک می باشد. فشار خون دیگر که کمتر به آن توجه شده ولی افزایش آن بسیار خطرناک است فشارخون حداقل یا مینیمم میباشد و آن فشاری است که در حال استراحت قلب به جدار شریان ها وارد می شود. این فشار در

افراد طبیعی حدود ۸۰ میلیمتر جیوه بوده و در صورتی که بیشتر از ۹۰ میلیمتر جیوه گردد ( حتی با عدم تغییر فشار خون ماکزیمم ) فرد دچار افزایش فشار خون شده است. افزایش

## فشار خون در دیالیز



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۰۹ - داخلی ۳۲۵۹۵۵۱۶

شماره سنده: ۹۵/eq/102/201	عنوان سنده: پمفت آموزشی هفته بیماران	دفتر بهبود کیفیت و آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		

نباید کدام دارو برای شما بهترین اثر را دارد و ممکن است چند هفته یا چند ماه انتخاب بهترین درمان طول بکشد.

### آیا فشار خون بالا قابل درمان است؟

در اکثر موارد نه اما بسیاری از افراد با درمان می توانند فشار خون بالا را تحت کنترل درآورند. فشار خون بالا که ثانویه به بیماری های دیگر باشد (بیماری کلیه یا دیابت) ممکن است با درمان بیماری اولیه درمان شود.

### توصیه ما به شما:

کنترل مرتب فشار خون  
رعایت رژیم کم نمک و کم چربی  
صرف مرتب داروها  
ورزش : عدم وزن گیری در حداصال بین جلسات دیالیز

منع: سایت معاونت درمان

سن : با افزایش سن شریان ها کم کم خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهند که ممکن است باعث افزایش فشار خون شود.

توارث : افزایش فشار خون اغلب از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

جنس : فشار خون بالا در مردان شایع تراز زنان است.

### چگونه این مشکل را درمان می کنند؟

اگر فشار خون شما بالاتر از حد طبیعی باشد ممکن است قادر باشید آن را بدون دارو به میزان طبیعی برسانید. کاهش وزن، تغییر در رژیم غذایی و ورزش و همچنین عدم وزن گیری در بین جلسات دیالیز ممکن است تنها درمانهایی باشد که شما نیاز دارید. اگر این تغییرات در شیوه زندگی ، فشار خون شمارا به میزان کافی پایین نیاورد ممکن است پزشک برای شما دارو تجویز کند. وقتی شروع به صرف دارو می کنید مهم است که داروهای خود را منظم صرف کنید و دقیقاً مطابق با آن چه تجویز شده عمل کنید. کم و زیاد کردن و با قطع ناگهانی داروها خطرناک است. ممکن است اول معلوم