

بیمار گرامی ...

در جهت کاهش عوارض بیماری و بهتر بودن خود نیاز است که تغییراتی در روش زندگی روزمره خود ایجاد کنید و یک سری مراقبت هایی انجام دهید . در اینجا راجع به پاره ای مهم از این تغییرات و مراقبت های لازم توضیحاتی ارائه می شود .

- ۲ - ورم صورت ، دست ها و پاها و اضافه وزن
- ۳ - تنگ شدن کفش به پا
- ۴ - تنگ شدن حلقه یا انگشت ره دست
- ۵ - تغییرات بینایی
- ۶ - کوتاه شدن و سخت شدن تنفس به دلیل جمع شدن مایعات در ریه ها
- ۷ - سردرد و کاهش انرژی
- ۹ - عدم رضایت از دیالیز
- ۹ - بروز عوارض متعدد ناشی از دفع مقدار زیاد مایعات در حین دیالیز از قبیل کاهش فشار خون ، احساس گیجی ، غش ، کرامپ عضلانی ، سردرد و تهوع
- پس یک بیمار همودیالیزی در مصرف مایعات محدودیت دارد و میزان محدودیت مایعات بستگی به مقدار تولید ادرار وی دارد .

روش اندازه گیری میزان مصرف مایعات :

صبح ساعت مشخصی (۸ یا ۹ صبح) که ادرار کردید آن را دور بریزید ، سپس در طی ۲۴ ساعت یعنی تا فردا صبح همان ساعت هرچه ادرار کردید را جمع کنید ، مجموع حجم آن ها ، حجم روزانه ادرار شما می باشد . این مقدار به علاوه ۴۰۰ تا ۸۰۰ سی سی ، مقدار مجاز مصرف مایعات روزانه شما می باشد .

به طور کلی مصرف آشامیدنی باید در حدی باشد که اضافه وزن بین دو جلسه همودیالیز بیش از ۲ کیلوگرم نباشد .



*در نارسایی کلیه آب و مایعات بدن بخوبی دفع نمی شود و به صورت آب اضافی تا جلسه بعدی دیالیز در بدن تجمع می یابد .

افزایش حجم مایعات بدن مشکلات زیر را به دنبال دارد :

- ۱ - افزایش فشار خون ، سخت شدن کار قلب و مشکلات قلبی

شماره سند: 95/eq/102/276	عنوان سند: پمفت آموزشی ویژه بیماران	 دفتر پهلو داریت و آموزش بیمارستان ۱۷ بهمن
شماره بازنگری: ۵		

میزان مصرف آب ومایعات در بیماران همودیالیزی



کلینیک آموزش سلامت
بیمارستان ۲۶ بهمن
۳۰۹ - داخلی ۳۲۵۹۵۵۱۶

- افزایش وزن روزانه شما حدود نیم کیلوگرم است.

در طول روز هر مقدار مایعات که می نوشید همان مقدار در یک بطری بزرگی یا در برگه ای یاداشت نمایید تا در پایان روز مشخص شود که چقدر مایعات نوشیده اید.

- بعداز مصرف غذا ، از آب نبات یا آدامس استفاده نمایید.
- مایعات را در لیوان کوچک یا فنجان مصرف کنید . برای خوردن سوپ ها و غلات پخته شده از چنگال استفاده کنید . از مصرف غذاهای خیلی شور یا خیلی شیرین اجتناب نمایید .

منبع: سایت معاونت درمان

کنترل مصرف مایعات و تشنگی :

- هر چه مقدار سدیم (نمک) مصرفی شما کمتر باشد ، نیاز بدن شما به آب کمتر است . پس رژیم غذایی کم سدیم را رعایت کنید .
- نوشیدنی های مجاز و مورد علاقه را به صورت یخمک یا آلاسکا در آورید و مصرف کنید .
- جهت رفع عطش و تشنگی می توانید از خرد های یخ به جای آب استفاده کنید (بهتر است هنگام تهییه یخ به آب مورد نظر مقداری آب لیمو اضافه کنید)
- مرطوب کردن لب ها با پارچه نمدار یا آب خنک در رفع تشنگی موثر است .
- دهانتان را با دهانشویه یا آب سرد غرغره کنید و آب را خارج کنید .
- جهت کنترل بهتر میزان دریافتی ، هر روز در یک ساعت معینی وبا یک لباس مشخص خود را وزن کرده و آن را ثبت نمایید .