

واکسیناسیون

دربیماران دیالیزی واکسیناسیون یک امر مهم در نظر گرفته شده است مطالعات نشان داده که انجام واکسیناسیون در جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی نقش به سزایی دارد .

۱- واکسن هپاتیت B:

هپاتیت B یک بیماری ویروسی که وقتی ویروس آن وارد بدن می شود کبد را درگیر می کند و در نهایت باعث سرطان کبد میشود . برای مبارزه با این بیماری به ۴ نوبت واکسن نیاز است . این واکسن به صورت نوبت اول ، یک ماه بعد نوبت دوم ، دوماه بعد نوبت سوم ، شش ماه بعد نوبت چهارم تزریق می شود .

(۰-۱-۲-۶) میلی لیتر در عضله بازویی دست راست و ۱ میلی لیتر در عضله بازویی دست چپ تزریق می شود .

یک ماه پس از آخرین تزریق سطح ایمنی واکسن اندازه گیری می شود در صورتی که بیش از ۱۰۰ واحد بین المللی در لیتر باشد پاسخ خوب است و اگر ایمنی واکسن ۱۰ تا ۱۰۰ واحد بین المللی در لیتر باشد پاسخ ضعیف و در صورتی که ایمنی کمتر از ۱۰ واحد بین المللی در لیتر باشد به عنوان عدم پاسخ در نظر گرفته می شود و باید واکسیناسیون تکرار شود .

۲- واکسن آنفولانزا :

به علت ایمنی پایین تر بیماران دیالیزی علیه ویروس های سرما خوردگی این واکسن تهیه شده که اول فصل پاییز در عضله بازویی سالی یک بار تزریق می شود .

۳- واکسن پنوموکوک یا ذات الریه :

ذات الریه یک عفونت شدید ریوی است که برای جلوگیری از آن در بیماران دیالیزی واکسن پنوموکوک توصیه می شود و تزریق بصورت ۰/۵ میلی لیتر در عضله بازویی می باشد .

این واکسن هر ۳ تا ۵ سال باید دوباره تزریق شود .

۴- واکسن مننگوکوک :

به عفونت و تورم پرده های مغز ، مننژیت می گویند که توسط ویروس ها - باکتری ها - قارچ ها ایجاد می شود .

عفونت به دنبال آسیب به جمجمه و ستون فقرات - به دنبال جراحی مغز و نخاع - عفونت گوش - تماس مستقیم با فرد آلوده از طریق آب دهان بوسیدن ، مسواک و سیگار بوجود می آید .

شماره سند: 95/eq/102/300 تاریخ تدوین: ۹۵/۸/۱۵	عنوان سند: پمفلت آموزشی ویژه بیماران	 دفتر بهبود کیفیت آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن
---	---	--

واکسیناسیون در بیماران دیالیزی



واحد آموزش به بیمار
بیمارستان ۲۲ بهمن

<https://22bahman-hospital.com/amouzeshbimar/>

آدرس سایت آموزش به بیمار بیمارستان ۲۲ بهمن

کلینیک آموزش سلامت بیمارستان ۲۲ بهمن

۳۲۵۹۵۵۱۶ - داخلی ۳۰۹

منبع: سایت معاونت درمان

علائم: تب بالا - سردرد شدید - تهوع

واستفراغ - گیجی - تشنج - گردن سفت

و کم حرکت - حساسیت به نور و کاهش تمایل
به خوردن .

راه های پیشگیری: رعایت موارد ساده

بهداشتی و در راس آن شستشوی دقیق دست
ها پس از توالت - دست زدن به حیوانات اهلی
یا حضور در مکان های شلوغ و عمومی . واکسن
این بیماری به نام مننگو کوک است و در
صورت همه گیری یا مسافرت به خارج از
کشور تزریق می شود . تزریق آن به صورت
۰/۵ میلی لیتر در عضله بازویی می باشد .

