

فرد انجام دهنده :

کشیدن مایع آسیت توسط پزشک ماهر انجام می شود

مراقبت پرستاری در حین و بعد از کشیدن مایع :

بیمار از نظر فشار خون و درجه حرارت خونریزی و عفونت بررسی می گردد.

پس از انجام پانسمان استریل فشاری انجام شود

نکات مهم مراقبتی قبل و بعد از کشیدن مایع آسیت

- ۱- تکمیل فرم رضایتنامه
- ۲- رعایت نکات استریل
- ۳- قراردادن بیمار در پوزیشن نشسته یا نیمه نشسته
- ۴- چک فشارخون قبل و بعد از کشیدن مایع آسیت
- ۵- خالی بودن مثانه

پیگیری های پس از ترخیص :


- ۱- از انجام فعالیتهای سنگین پرهیز کنند
- ۲- در صورت داشتن تب یا بالا و پایین رفتن فشار خون به مرکز درمانی مراجعه کنید

<https://22bahman-hospital.com/amouzeshbimar/>

آدرس سایت آموزش به بیمار بیمارستان ۲۲ بهمن

شماره کلینیک سلامت بیمارستان ۲۲ بهمن :
۰۵۱-۳۲۵۹۵۵۱۶ داخلی ۳۰۹

کشیدن مایع آسیت



شماره سند: ۳۳۴/Q1/EQ/

تاریخ تهیه: ۱۳۹۹/۸/۱۱

گروه هدف: بیماران و همراهیان

واحد آموزش به بیمار

منبع : up to date

آسیت (آب آوردن شکم)

تعریف : جمع شدن مایع اضافی در حفره شکم است که این مایع معمولاً مایع سرروز است که زرد کمرنگ و روشن است

علائم جمع شدن مایع در شکم :

هرچه مایع بیشتر تجمع یابد، حجم و اندازه شکم افزایش بیشتری می یابد. درد و احساس سنگینی در شکم - بی اشتها - سوزش سر دل - تهوع - یبوست - تنگی نفس (به علت فشار مایع روی دیافراگم) - کمر درد -

علل تجمع مایع در شکم :

- ۱- سیروز کبدی
- ۲- روده آسیب پذیر
- ۳- بیماریهای قلبی
- ۴- عفونت
- ۵- بیماریهای کلیوی
- ۶- بیماریهای لوزالمعده

مواردی که تخلیه مایع آسیت را لازم می سازد

۱- جهت تشخیص : تجزیه تحلیل مایع تخلیه شده از

شکم

جهت درمان : خارج کردن مایع تجمع یافته در شکم

و از بین بردن تورم ، سنگینی و کمر درد فرد



آمادگی لازم قبل از خارج کردن مایع از شکم :

درباره نحوه انجام کار و علت آن به بیمار کاملاً توضیح می دهند محل مورد نظر تمیز شده و موهای زائد تراشیده می شود

روش انجام :

در صورت لزوم از بی حسی موضعی استفاده گردد سپس با سوزن به محل وارد شده و مایع شکم کشیده می شود اگر میزان مایع زیاد باشد بوسیله ست سرم به کیسه وصل شده تا مایع به طور کامل خارج گردد بعد از انجام کار پانسمان استریل با فشار گذاشته می شود

