

عوارض همودیالیز

شایع ترین عوارض هنگام دیالیز به ترتیب عبارتند از:

افت فشارخون - گرفتگی عضلانی - تهوع - استفراغ - سردرد - دردپشت - خارش - تب ولرز

افت فشارخون : معمولا به علت کاهش شدید حجم خون می باشد .

گرفتگی عضلانی : معمولا به علت افت فشار خون وزمانی که زیر وزن خشک می رسند می باشد .

درمان گرفتگی عضلانی : 1 - تزریق

نرمال سالین - 2 - اگر بیمار دچار

دیابت نباشد تزریق گلوکز غلیظ مفید

می باشد .

3 - تزریق سرم نرمال سالین غلیظ

4 - کاهش میزان مایع(وزن گرفته شده توسط دستگاه دیالیز

5- پیشگیری از افت فشارخون

6 - مصرف ویتامین

7- مصرف کارنیتین

8 - مصرف قرص اگزاپام دوساعت قبل از دیالیز به دلایل ناشناخته در کاهش گرفتگی عضله موثر می باشد . تهوع و استفراغ بیشتر مربوط به کاهش فشارخون است .



درمان :

بهترین کار، درمان افت فشار خون می باشد که در صورت نیاز می توان از داروهای ضد تهوع نیز استفاده کرد . کاهش مایع(وزن گرفته شده توسط دستگاه) و کاهش دوردستگاه دیالیز نیز موثر می باشد .

سردرد : با توجه به این که غلظت

کافیین خون در حین دیالیز به سرعت کاهش می یابد سردرد می تواند علامت قطع کافیین باشد .

درمان : مصرف استامینوفن در حین


دیالیز

پیشگیری : کاهش جریان خون


یاکم کردن دوردستگاه - کاهش سدیم مایع

دیالیز - مصرف چای یا قهوه حین دیالیز

موثر است .

شماره سند: 95/eq/102/251 شماره بازنگری: 6 تاریخ بازنگری: 1406/11/5	عنوان سند: پمفلت آموزشی ویژه بیماران	 دفتر بهبود کیفیت آموزش بیمارستان 22 بهمن
---	--	--

عوارض همودیالیز



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان 22 بهمن

32595516 - داخلی 309



منبع:

سایت معاونت درمان

<https://22bahman->

hospital.com/amouzeshbimar/

جهت اطلاعات بیشتر اسکن کنید .



درد سینه و پشت : علت آن ناشناخته

است تعویض نوع صافی - دردهای قلبی هم
اگر وجود داشت بایدمشاوره قلب نیز انجام
شود . تجویز اکسیژن به میزان 3 لیتر در
دقیقه کاهش سرعت جریان خون -
کاهش سرعت پمپ

خارش : اگر هنگام دیالیز خارج ایجاد شود

ممکن است علامت افزایش حساسیت به صافی
باشد .

درمان : تعویض صافی - مصرف آنتی

هیستامین - استفاده از مواد نرم کننده پوست
وماساژ پوست با روغن بادام تلخ ویا روغن
زیتون