


شماره سند: 92/Q/102/114 شماره بزرنگری: ۵ تاریخ بزرنگری: ۱۴۰۶/۱۰/۰۱	عنوان سند: پمفلت آموزشی	 بیمارستان خیره ۲۲ بهمن دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ۲۲ بهمن
---	----------------------------	--

هموروئید

ویژه بیماران



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن

۰۵۱۴۱۴۴۳ - داخلی ۱۱۷۷

منبع: سایت معاونت درمان

آدرس سایت آموزش به بیمار بیمارستان ۲۲ بهمن

<https://22bahman-hospital.com/amouzeshbimar/>



جهت مشاهده فایل های آموزشی بیشتر

لطفا بارکد زیر را اسکن کنید



درمان :

الف) راههای درمان طبی (داروئی) هموروئید

۱- نشستن در لگن آب ولرم و بتادین.

۲- استفاده از داروهایی که از یبوست پیش گیری می کنند.

ب) درمان جراحی: در عمل جراحی هموروئیدهایی که گشاد و متسع شده باشند بوسیله عمل جراحی برداشته می شوند.

عوارض جراحی هموروئید

الف- بی اختیاری مدفوع

ب- افزایش سوزش و خارش بدلیل ترشحات ناحیه

ج- عود هموروئید (دوباره ایجاد شدن هموروئید)

نکات قابل توجه برای بیمار

الف- در صورت هر نوع خونریزی بعد از عمل یا درد شدید به پزشک خود مراجعه کنید.

ب- در صورت بی اختیاری مدفوع به پزشک مراجعه کنید.

ج- به نکاتی که پزشکان و پرستاران بیمارستان

می گویند کاملا گوش کرده و آنها را یک به یک اجرا کنید.

هموروئید:

عبارتست از گشادشدن سیاهرگهای ناحیه مقعد که یکی از شایعترین بیماری های جراحی می باشد که متاسفانه بدلیل نداشتن آگاهی افراد و همچنین بدلیل موقعیت آناتومیک آن(که در ناحیه مقعد)می باشد کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اکثر مردم هنگامی مراجعه می کنند که نیاز به درمان جراحی دارند.در حالیکه با مراجعه زودرس و مشورت با پزشک میتوان با درمان طبی(دارویی) آنرا علاج کرد.

در ناحیه مقعد(شرمگاه)بعد از پوست به ناحیه مخاط(لایه نازک پوست) می رسیم در این ناحیه رگهایی وجود دارد که در صورت فشار زیاد و ضربه مانند رگهای پاگشاد می شوند و دیواره این رگها نازک میشود و باعبور مدفوع سفت دچار خونریزی می شوند .

یکی از شایعترین علائم هموروئید خونریزی بعد از دفع و اجابت مزاج است

سوزش و خارش در ناحیه مقعد از دیگر علائم این بیماری است.

افرادیکه بمدت طولانی دچار بیبوست(مدفوع سفت) هستند و مدفوع سفت بطور مداوم با این رگها در تماس است بیشتر دچار این حالت می شوند.

بطور کلی عوامل زیر احتمال ایجاد هموروئید را در فرد افزایش می دهند:

۱- مدفوع سفت

۲- زور زدن طولانی مدت

۳- افزایش فشار داخل شکم(مانند دوران حاملگی).

انواع هموروئید :

الف)هموروئید داخلی:هموروئیدهای داخلی که توسط لایه نازک پوست(مخاط) پوشیده شده اند معمولا خونریزی کرده و یا دچار بیرون زدگی(پرولاپس) می شوند ولی درد ندارند.شکایت بیمارعمدتا بصورت احساس پرتشدگی رکتوم(راست روده) می باشد.که همراه با ترشح موکوس چکیدن قطرات خون روشن در هنگام اجابت مزاج می باشد.

بطور کلی علائم هموروئید داخلی عبارتست از:

۱- خونریزی بدون درد.

۲- احساس پرتشدگی رکتوم(راست روده)

۳- ترشح موکوسی و چکیدن قطرات خون روشن در هنگام اجابت مزاج.

ب)هموروئید خارجی:در این هموروئید که در زیر پوست مقعد وجود دارند در طول زمان می تواند بعلت اتساع مکرر بزرگ شود گاهی اوقات وجود یک لخته در درون یک هموروئید خارجی باعث درد شدید و در صورت عبور لخته موجب خونریزی خواهد شد.

بنابراین مهمترین علامت هموروئید خارجی درد شدید می باشد.