


تشخیص :

سونوگرافی شایع ترین روش تشخیصی است . اما سی تی اسکن و ام آر آی دقیق تر هستند وجود حداقل دو کیست در هر کلیه تشخیص را قطعی می کند . افراد مبتلا تا سالها ممکن است بدون علامت باشند . چون کیستها طی سالیان رشد می کنند و در ابتدا کارکرد کلیه ها طبیعی هستند .



علائم :

- 1- درد پهلوها شایع ترین علامت است .
- 2- عفونت ادراری و عفونت کیستها
- 3- وجود خون در ادرار
- 4- کیستهای کبد ولوزالمعده
- 5- فشارخون بالا
- 6- اختلالات دریچه های قلب
- 7- سنگ کلیه ها
- 8- حجم زیاد ادرار تولید شده
- 9- بزرگ شدن کلیه ها که از روی شک قابل لمس است .
- 10- متورم شدن عروق مغز که با سردرد همراه است .



کلیه پلی کیستیک یک بیماری نسبتا خطرناک است که در آن کلیه ها بطور پیشرونده کار خود را از دست می دهند . متاسفانه درمان ندارد ولی با اقدامات درمانی مناسب می توان از سرعت کار کلیه ها جلوگیری کرد .

بیماری کیست کلیه را نباید با بیماری کلیه های پلی کیستیک اشتباه گرفت . در کلیه های پلی کیستیک هر دو کلیه را تعداد بیشماری کیست پر می کند وارثی است . این کیستها در 40 درصد موارد در سایر اعضا مثل کبد و عروق مغز نیز دیده می شود . که گاهی سبب خونریزی مغزی می شود . تعداد این کیستها گاهی به هزاران عدد می رسد و با بزرگ شدن آنها سایز کلیه ها هم بزرگ می شوند . اکثر این بیماران بین 20 تا 30 سالگی فشار خون می گیرند . این بیماران در دهه پنجم زندگی نیاز به دیالیز پیدا می کنند .

شماره سند: 95/eq/102/272 شماره بازنگری: 3 تاریخ بازنگری: 1406/11/5	عنوان سند: پمفلت آموزشی ویژه بیماران	 دفتر بهبود کیفیت آموزش بیمارستان 22 بهمن
---	--	--

کلیه پلی کیستیک



کلینیک آموزش سلامت

بیمارستان 22 بهمن

32595516 - داخلی 309

منبع: سایت معاونت درمان



<https://22bahman-hospital.com/amouzeshbimar>

جهت اطلاعات بیشتر بارکد زیر را اسکن کنید.



درمان :

متأسفانه درمان ندارد وبصورت علامتی مشکلات را رفع می کنند . مثلاً جهت درد ، مسکن های مناسب و جهت فشارخون ؛ داروی ضد فشارخون استفاده می شود . گاهی رژیم درمانی ویا ورزش در کنترل فشار خون مفید است . نارسایی کلیه که در دهه پنجم نیاز به دیالیز پیدا می کنند بهتر است در این مرحله پیوند کلیه انجام شود . جهت عفونت ادراری آنتی بیوتیک مناسب تجویز می شود .